

Fructose

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82757

שם הבדיקה

Fructose

שמות נוספים לבדיקה

נחכות פרקטוז בנוזל הזרע בדיקת פרקטוז

לאבחנה/טיפול

לשלילת חסימה או חסר מולד בצינורות הזרע

שיטת ביצוע הבדיקה

בדיקה איכותית על בסיס ריאקציה כימית

מגבלות השיטה

זמן ביצוע בדיקה 1.5-2 שעות נפח נוזל זרע נדרש 0.5 מ"ל

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[בנק הזרע](#)

מיקום המעבדה

בנין יולדות, מזכירות: 03-5302804 מעבדה: 03-5302991

טלפון למידע, בירורים ותיאום

מזכירות: 03-5302804 מעבדה: 03-5302991

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

במקרה של אזוספרמיה, נבדקת כמות הפרוקטוז בדגימה, הפרוקטוז הוא נוזל המיוצר בשלפוחיות הזרע, שתפקידו הוא נתינת אנרגיה לצורך שיפור התנועתיות של תאי הזרע. כאשר העדרו או אפילו מעוטו, מצביעים על נטיה לאזוספרמיה על רקע חסימתי, דבר הנותן אינדיקציה מדוייקת להמשך הטיפול המתאים. הבדיקה מתבצעת אחת לשבועיים

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדת בנק הזרע

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

מתן זרע עד שעה וחצי טרם הבדיקה, הוצאת הדגימה בחדר מתן זרע במעבדה או בבית המטופל.

סוג הדגימה

נוזל סמינלי עליון של הזרע לאחר סירכוז

נפח דגימה

פרקציה מהנוזל הסמינלי (0.1 מ"ל)

כלי קיבול לדגימה

כוסית פלסטיק מפוליפרופילן

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

העברה בטמפ' חדר בלבד, אין לקרר או לחמם

תנאי שינוע

נשיאה ע"י המטופל \ סניטר \ רופא \ אחות. שימוש בעגלה ייעודית במקרה של ריבוי דגימות

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

שעה וחצי

קריאת תוצאות

מידע כללי

בדיקה איכותית

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

Normal vs. Low איכותי (1000µg/ml)

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

לא ישים

בקרת איכות חיצונית חלופית

לא ישים

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

01-Feb

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה: